

به نام خدا

مینی دوره رایگان داروهای ترالی گروه آموزشی ویال



برای دریافت تدریس رایگان داروهای ترالی
به سایت vialteam.com مراجعه کنید



[vial_tadris](https://t.me/vial_tadris)



vialteam.com



[vial.ir](https://www.instagram.com/vial.ir)



گروه آموزشی ویال

تیم ویال فعالیت حرفه‌ای خودش رو از سال ۹۹ در زمینه آزمون‌های پرستاری شروع کرده. ما در تیم ویال در تلاشیم با ارائه با کیفیت‌ترین و بروزترین آموزش‌ها و مشاوره‌ها هر چیزی را که داوطلب برای موفقیت در آزمون‌های پرستاری نیاز داره فراهم کنیم. موسسین گروه آموزشی ویال آقای احسان جلال آبادی رتبه ۱ ارشد پرستاری و آقای ایمان طاهری رتبه ۲۳ ارشد پرستاری و تمامی مدرسین و مشاورین فعال در مجموعه ویال از رتبه‌های برتر و نخبگان پرستاری هستند.



[vial_tadris](https://t.me/vial_tadris)



vialteam.com



[vial.ir](https://www.instagram.com/vial.ir)

خدمات گروه آموزشی ویال:

خدمات اصلی

دوره جامع ارشد



دوره جامع استخدامی



دوره جمع بندی



برگزاری آزمون



تدریس روزانه تلگرام



مینی دوره انتخاب منبع ارشد



مینی دوره دروس تخصصی



مینی دوره داروهای ترالی



خدمات رایگان



vial_tadris



vialteam.com



vial.ir

اعضای گروه آموزشی ویال:



احسان جلال آبادی

رتبه 1 ارشد پرستاری

مشاور و مدرس آزمونهای ارشد و استخدامی
عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان
عضو بنیاد ملی نخبگان
سابقه 4 سال مشاوره در کنکور سراسری



ایمان طاهری

رتبه 23 ارشد پرستاری

مشاور و مدرس آزمونهای ارشد و استخدامی
عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان
سابقه 4 سال مشاوره در کنکور سراسری



حمید سکوزاده

رتبه 10 ارشد پرستاری

مشاور و مدرس آزمونهای ارشد و استخدامی
عضو بنیاد ملی نخبگان



محدثه رضانی

رتبه برتر ارشد پرستاری

استعداد درخشان

مشاور و مدرس آزمونهای ارشد و استخدامی



الهه حبیبپور

رتبه 20 ارشد پرستاری

مشاور و مدرس آزمونهای ارشد و استخدامی



احسان توکلی

رتبه 37 ارشد پرستاری

مشاور و مدرس آزمونهای ارشد و استخدامی پرستاری



مصطفی صبورمقدم

رتبه 34 ارشد پرستاری

مشاور و مدرس آزمونهای ارشد و استخدامی پرستاری



Vial

vial_tadris

vial.ir

vialteam.com

اپی نفرین



دسته دارویی:

آگونیست گیرنده‌های آلفا و بتا آدرنرژیک

شکل دارو در تریالی احیا و دوز دارو:

● آمپول ۱ میلی گرم در ۱ میلی لیتر (۱:۱۰۰۰)

● یا ۱ میلی گرم در ۱۰ میلی لیتر (۱:۱۰,۰۰۰)



کاربردها:

● درمان ایست قلبی در احیای قلبی ریوی (CPR)

● مدیریت آنافیلاکسی (واکنش‌های آلرژیک شدید)

● درمان برونکواسپاسم در آسم شدید

موضعی بیش

● افزایش فشار خون در شوک‌های ناشی از افت فشار خون شدید

عوارض:

● تاکیکاردی و آریتمی قلبی: افزایش شدید ضربان قلب یا ایجاد

ریتم‌های غیرطبیعی قلب که ممکن است خطرناک باشند

● گر گرفتگی: احساس گرما و قرمزی در پوست، به‌ویژه در صورت

● فشارخون بالا: افزایش ناگهانی فشار خون که در موارد شدید

ممکن است باعث سردرد یا خونریزی شود

● ایسکمی موضعی: در صورت تزریق نادرست یا استفاده موضعی

بیش از حد، ممکن است کاهش جریان خون و نکروز بافتی رخ دهد



Vial

vial_tadris

vial.ir

vialteam.com

آتروپین



دسته دارویی:

آنتی کولینرژیک (مهارکننده گیرنده‌های موسکارینی)

شکل دارو در ترالی احیا و دوز دارو:

آمپول ۰.۵ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

کاربردها:

- درمان برادی کاردی علامت دار
- درمان مسمومیت با ارگانوفسفره یا آفت کش ها
- کاهش ترشحات برونشial قبل از جراحی
- معاینه چشمی برای گشاد کردن مردمک (به صورت موضعی)

عوارض:

- تاکی کاردی و افزایش ضربان قلب
- تاری دید و گشاد شدن مردمک
- یبوست: کاهش حرکات دستگاه گوارش
- خشکی دهان و گلو: به دلیل کاهش ترشحات بزاقی
- احتباس ادرار: به ویژه در بیماران مبتلا به هیپرپلازی پروستات
- گرگرفتگی و افزایش دمای بدن: به دلیل کاهش تعریق





Vial

vial_tadris

vial.ir

vialteam.com



آدنوزین

دسته دارویی: آنتی آریتمی قلبی

شکل دارو در ترالی احیا و دوز دارو:

- آمپول ۶ میلی گرم در ۲ میلی لیتر
- دوز اولیه: ۶ میلی گرم وریدی سریع (در مدت ۱-۲ ثانیه)
- در صورت عدم پاسخ، تکرار دوز ۱۲ میلی گرم پس از ۱-۲ دقیقه

کاربردها:

- درمان تاکی کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT)
- بازگرداندن ریتم طبیعی قلب در بیماران مبتلا به آریتمی‌های فوق بطنی



عوارض:

- گرگرفتگی و احساس گرما
- افت موقت فشار خون
- تنگی نفس یا احساس فشار در قفسه سینه
- برادی کاردی یا توقف موقت ضربان قلب
- سرگیجه و سردرد
- تهوع و ناراحتی گوارشی



Vial

vial_tadris


vial.ir

vialteam.com

فوروز مايد (لازيكس)



دسته دارویی: دیورتیک



شکل دارو در ترالی احیا و دوز دارو:

● آمپول ۲۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر

● آمپول ۴۰ میلی گرم در ۴ میلی لیتر

کاربردها:

- درمان ادم ناشی از نارسایی قلبی، سیروز کبدی یا بیماری‌های کلیوی
- مدیریت ادم ریوی حاد برای کاهش مایع درون ریه‌ها
- کاهش فشار خون در بیماران با هیپرتانسیون مقاوم
- القای دیورز در بیماران با هایپرکالمی یا هایپرکلسمی شدید

عوارض:

- افزایش BUN و کراتینین: به دلیل کاهش حجم خون و کاهش فیلتراسیون کلیوی
- کاهش قند خون بیماران دیابتی: به دلیل اثرات دارو بر متابولیسم بدن
- افت فشار خون: ناشی از کاهش حجم مایع بدن
- دهیدراتاسیون: از دست دادن بیش از حد مایعات و علائم مربوط به آن (خشکی دهان، سرگیجه)
- اختلال شنوایی (اوتوتوکسیسیتی): کاهش موقت یا دائم شنوایی در دوزهای بالا یا تزریق سریع
- بهم‌ریختگی تعادل الکترولیت‌ها: شامل هیپوکالمی، هیپوناترمی، هیپوکلسمی و هیپومنیزمی که می‌تواند منجر به ضعف عضلانی، آریتمی قلبی یا اسپاسم عضلات شود



vial_tadris

vial.ir

Vial vialteam.com

دیگوکسین



دسته دارویی: آنتی آریتمی



شکل دارو در ترالی احیا و دوز دارو:

● آمپول ۰.۵ میلی گرم در ۲ میلی لیتر

کاربردها:

● بهبود قدرت انقباضی قلب

● مدیریت و پیشگیری از آریتمیهای دهلیزی مانند فیبریلاسیون

● دهلیزی و فلوتر دهلیزی

عوارض:

● بینایی: اختلالات بینایی مانند مشاهده هاله های سبز یا زرد اطراف اشیاء

● گوارشی: بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، درد شکمی

● قلبی: آریتمی ها، بلوک قلبی، برادی کاردی

● عصبی: سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، توهم

● پوستی: حساسیت به نور، بثورات پوستی

مسمومیت با دیگوکسین را جدی بگیرید تهوع، استفراغ آریتمیهای خطرناک تغییرات بینایی و گیجی میتوانند نشانه های مسمومیت باشند.

هایپوکالمی خطر مسمومیت با دیگوکسین را افزایش میدهد و هایپر کالمی باعث کاهش اثر دارو و بی تأثیر شدن آن میشود بنابراین چک کردن سطح پتاسیم ضروری است.



vial_tadris

vial.ir

Vial vialteam.com

دiazepam



دسته دارویی:

بنزودیازپین

(ضد اضطراب، آرام‌بخش، شل‌کننده عضلانی، ضد تشنج)

شکل دارو در ترالی احیا:

آمپول ۱۰ میلی‌گرم در ۲ میلی‌لیتر

کاربردها:

- مدیریت و کنترل تشنجهای حاد
- کاهش اضطراب و تنش عصبی در شرایط حاد
- ایجاد حالت آرام‌بخش قبل از انجام اقدامات پزشکی یا جراحی
- شل کردن عضلات در اسپاسم‌های شدید عضلانی ناشی از اختلالات نورولوژیک یا اسکلتی-عضلانی



عوارض:

- دپرسیون تنفسی، به‌ویژه در دوزهای بالا
- اختلالات شناختی، از جمله فراموشی و گیجی
- افت فشار خون و برادی‌کاردی در تزریق وریدی سریع
- سرکوب سیستم عصبی مرکزی: خواب‌آلودگی، سرگیجه و ضعف



Vial

vial_tadris

vial.ir

vialteam.com

نالوکسان

دسته دارویی:


آنتاگونیست گیرنده‌های اپیوئیدی

شکل دارو در ترالی احیا:

آمپول ۰.۴ میلی‌گرم در ۱ میلی‌لیتر

کاربردها:

- برطرف کردن سرکوب تنفسی ناشی از مصرف بیش‌ازحد اپیوئیدها
- مدیریت مسمومیت حاد با مواد مخدر (مانند مورفین، فنتانیل و هروئین)
- واکنش به دپرسیون تنفسی ناشی از مصرف اپیوئیدها در بیماران
- تحت بیهوشی یا دریافت‌کننده داروهای مخدر



عوارض:

- حالت تهوع، استفراغ و سردرد
- سندرم ترک (در افراد وابسته به اپیوئیدها)
- شامل بی‌قراری، تعریق، تاکیکاردی، تهوع و استفراغ
- آریتمی‌های قلبی در بیماران با بیماری‌های قلبی زمینه‌ای
- ادم ریوی در موارد نادر و پس از احیای بیماران با دپرسیون شدید تنفسی
- افزایش فشار خون و تاکیکاردی ناشی از آزاد شدن کاتکولامین‌ها



Vial

vial_tadris

vial.ir

vialteam.com

دوبوتامین



دسته دارویی:


داروی اینوتروپیک (آگونیست بتا-۱ آدرنرژیک)

شکل دارو در ترالی احیا:

ویال ۲۵۰ میلی گرم در ۲۰ میلی لیتر

کاربردها:

- افزایش قدرت انقباضی قلب در نارسایی قلبی حاد و مزمن
- مدیریت شوک کاردیوژنیک برای بهبود برون ده قلبی
- حمایت دارویی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مقاوم به درمان های استاندارد
- تست استرس قلبی در بیماران ناتوان از ورزش (اکوکاردیوگرافی استرسی با دوبوتامین)



عوارض:

- تاکیکاردی و آریتمی های قلبی
- هایپوتانسیون و هایپرتانسیون
- سردرد، تهوع و اضطراب
- درد قفسه سینه (به دلیل افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن)
- هیپوکالمی (در مصرف طولانی مدت یا دوزهای بالا)



Vial

vial_tadris

vial.ir

vialteam.com

میدازولام



دسته دارویی:

بنزودیازپین

(ضد اضطراب، خواب آور، آرام بخش و ضد تشنج)

شکل دارو در ترالی احیا:

آمپول ۵ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

کاربردها:

- آرام بخشی و القای بیهوشی قبل از جراحی و پروسیجرهای پزشکی
- تضعیف پاسخ های اضطرابی و استرس بیماران قبل از جراحی
- کنترل و درمان تشنج
- آرام بخشی بیماران ونتیله در ICU
- ایجاد فراموشی آنترگرا در بیهوشی و پروسیجرهای دردناک

عوارض:

- افت فشار خون و برادیکاردی
- دپرسیون تنفسی (به ویژه در دوزهای بالا یا تجویز سریع وریدی)
- خواب آلودگی، گیجی، سردرد و ضعف عمومی
- واکنش های پارادوکسیکال
(مانند بی قراری، تحریک و توهم در برخی بیماران)

